

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Pemberian Susu Formula Pada Bayi 0-6 Bulan dengan Kejadian Diare di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Lebih dari separuh 53.6% ibu telah memberikan susu formula pada bayi 0-6 bulan di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024.
2. Lebih dari separuh 52.4% bayi 0-6 bulan mengalami diare di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024.
3. Adanya hubungan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan dengan kejadian diare di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024 dengan nilai *p value* $0,000 < \alpha (0.05)$.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan lebih memahami lagi tentang hubungan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan dengan kejadian diare.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan ini dengan menggunakan variabel yang berbeda. Sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan.

3. Bagi Intitusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan atau memberi pembelajaran baik di kalangan mahasiswa pendidikan agar dapat mengetahui hubungan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan dengan kejadian diare dan dapat dijadikan sumber pustaka untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang medis.

4. Bagi Puskesmas Lubuk Buaya

Diharapkan dapat meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang efek susu formula terhadap kejadian diare yang dapat ditetapkan oleh masyarakat khususnya para ibu yang memiliki anak bayi 0-6 bulan.

