

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata kelancaran ASI sebelum diberikan pijat oksitosin adalah 2,93, standar deviasi 0,829, nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 3 dan rata-rata kelancaran ASI sebelum diberikan pijat oksitosin adalah 4,21, standar deviasi 0,802, nilai terendah adalah 3 dan nilai tertinggi adalah 5.
2. Ada Pengaruh Terapi Pijat Oksitosin Terhadap Kelancaran ASI pada Ibu menyusui di Ruangan Kebidanan RSUD Dr. Rasidin Padang Tahun 2025 (pvalue=0,003).

B. Saran

1. Bagi RSUD Dr. Rasidin Padang
Diharapkan perawat dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang kelancaran ASI pada ibu menyusui dengan cara memberikan edukasi pada suami dan keluarga untuk proses melakukan pijat oksitosin bagi ibu dengan ASI tidak lancar.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Saran peneliti bagi pendidikan keperawatan yaitu agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang keperawatan maternitas tentang pengaruh pijat oksitosin terhadap kelancaran ASI pada ibu Menyusui

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian tentang variabel lain yang dapat meningkatkan kelancaran ASI pada ibu menyusui.

