

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan manajemen asuhan kebidanan pada Ny."S" dari tanggal 07 November - 02 Desember 2024 dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan manajemen SOAP mulai dari kehamilan trimester II, persalinan, nifas dan neonatus maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peneliti telah melakukan pengkajian data secara subjektif dan objektif pada Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.
2. Peneliti telah menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi diagnose, masalah dan kebutuhan objektif pada Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu , persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.
3. Peneliti telah menganalisa dan menentukan diagnosa potensial pada Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.
4. Peneliti telah menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera baik mandiri, kolaborasi maupun rujukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.

5. Peneliti telah menyusun rencana asuhan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan objektif Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.
6. Peneliti telah menerapkan tindakan asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan rencana yang efisien pada Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.
7. Peneliti telah mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil pelayanan kebidanan pada Ny."S" G3P2A0H2 dengan kehamilan trimester III dimulai dari usia kehamilan 34-35 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke - 6 di PMB Netti Sumarni Kota Padang Tahun 2024.

B. Saran

1. Bagi peneliti

Dengan dilakukannya penelitian mengenai asuhan berkesinambungan terhadap Ny. "S" peneliti jadi mengetahui dan mengerti mengenai asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir.

2. Bagi Praktek Mandiri Bidan

Diharapkan setelah melakukan asuhan pada Ny."S" hendaknya lahan praktek tetap terus meningkatkan mutu pelayanan agar dapat memberikan asuhan yang lebih baik sesuai dengan standar asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

3. Bagi Profesi Bidan

Diharapkan setelah dilakukan asuhan paa Ny. "S", dapat menjadi evaluasi bagi profesi bidan agar profesi bidan dapat lebih mengembangkan asuhan kebidanan komprehensif berdasarkan *evidence based* yang sudah ada terkait asuhan yang diberikan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

4. **Bagi Subjek Penelitian**

Dengan adanya studi kasus yang dilakukan pada Ny."S" ini diharapkan dapat bermanfaat bagi responden sebagai bentuk asuhan kebidanan yang aman dan nyaman serta berdasarkan teori agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan pada bayi baru lahir.

