BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan lama penggunaan suntik 3 bulan pada akseptor kb di Puskesmas Kuranji, Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lebih dari separoh sebanyak 41 responden (58.6%) menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan $\geq$ 1 tahun.
2. Lebih dari separoh sebanyak 42 responden (60.0%) kadang- kadang mengalami keputihan .
3. Terdapat hubungan lama penggunaan suntik 3 bulan dengan kejadian keputihan pada akseptor kb di puskesmas kuranji, kota padang Tahun 2025 dengan nilai $p = 0,00$.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik kalangan mahasiswa pendidikan agar dapat mengetahui hubungan lama penggunaan suntik 3 bulan dengan kejadian keputihan pada akseptor kb dan dapat dijadikan sumber pustaka untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang medis.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan

lebih memahami lagi tentang lama penggunaan kb suntik 3 bulan dengan kejadian keputihan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang hubungan lama penggunaan suntik 3 bulan dengan kejadian keputihan pada akseptor KB.

4. Bagi Puskesmas Kuranji

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk Pimpinan Puskesmas Kuranji dan tenaga kesehatan khususnya bidan tentang pengaruh penggunaan kb suntik 3 bulan ini terhadap kejadian keputihan karena untuk penggunaan kb suntik 3 bulan ini untuk penggunaannya termasuk dalam kategori kb yang paling di gemari masyarakat ,sehingga kita sebagai tenaga kesehatan perlu untuk memahami lebih dalam lagi terkait hal ini untuk menjamin kesehatan,kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat kita.

— 2024 —