

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata nyeri sebelum penerapan *biological nurturing baby led feeding* mean 6,50 standar deviasi 1,033 dan nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 8
2. Sesudah penerapan *biological nurturing baby led feeding* mean 3,56, standar deviasi 0,964 dan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 5 di Ruangan Kebidanan RSUD Dr. Rasidin Padang.
3. Ada pengaruh penerapan *biological nurturing baby led feeding* terhadap penurunan nyeri pada ibu post partum *sectio caesarea* di RSUD Dr. Rasidin Padang.

B. Saran

1. Bagi RSUD Dr. Rasidin Padang

Diharapkan petugas kesehatan khususnya di ruangan kebidanan dapat memberikan penerapan tentang *biological nurturing baby led feeding* di rumah sakit dengan cara memberikan intervensi secara langsung kepada pasien.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penerapan *biological nurturing baby led feeding*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian tentang variabel lain yang berhubungan dengan *biological nurturing baby led feeding* pada ibu post partum sectio caesarea.