

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Separoh 24 orang (50,0%) ibu hamil mengalami preeklampsia di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024.
2. Kurang dari separoh 18 orang (37,5%) ibu hamil dengan usia beresiko di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024.
3. Hampir dari separoh 20 orang (41,7%) ibu hamil dengan paritas primigravida di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024.
4. Lebih dari separoh 25 orang (52,1%) ibu hamil memiliki riwayat hipertensi di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024.
5. Ada hubungan antara usia ibu hamil dengan preeklampsia di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024 dengan nilai *p-value* 0,037 dan didapatkan nilai OR 95% CI 4.491.
6. Ada hubungan paritas dengan preeklampsia di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024 dengan nilai *p-value* 0,040 dan didapatkan nilai OR 95% CI 2.143.
7. Ada hubungan antara riwayat hipertensi dengan preeklampsia di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024 dengan nilai *p-value* 0,000 dan didapatkan nilai OR 95% CI 35.000.

8. Faktor yang paling dominan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di RSUD Arosuka Solok Tahun 2024 adalah factor paritas dengan nilai Exp (B) 9.509 (CI 95% 1.165 – 77.607). ibu hamil yang memiliki riwayat paritas primigravida lebih beresiko 9 kali untuk terjadi preeklampsia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor resiko yang lainnya terkait kejadian preeklampsia di tempat atau wilayah yang berbeda agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu peneliti disarankan untuk membandingkan faktor-faktor resiko preeklampsia antara ibu hamil dengan preeklampsia dan ibu hamil tanpa preeklampsia.

2. Bagi Rumah Sakit RSUD Arosuka Solok

Kepada rumah sakit melalui tenaga kesehatan khususnya perawat agar dapat memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai faktor resiko terjadinya preeklampsia dan meningkatkan pelayanan ANC pada ibu hamil terutama melakukan skrining faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia. Karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hubungan yang signifikan antara usia, paritas dan riwayat hipertensi.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan bagi institusi pendidikan untuk berkolaborasi dengan lembaga kesehatan dalam melatih calon tenaga kesehatan deteksi dini dan manajemen preeklampsia.

